

Natur. Erlebnis. Chiemsee

Der Chiemsee – ein bedeutender Lebensraum für Vögel



Fitis (*Phylloscopus trochilus*, engl. Willow Warbler), Brutvogel, April bis September

Singvögel

Die vielfältige Vogelwelt zählt zu den besonderen Schätzen des Chiemsees. In dem abwechslungsreichen Lebensraum mit Verlandungsflächen, Streuwiesen, Gebüsch, Wäldern und Mooren und der Wasserfläche selbst wurden seit 1950 über 300 Vogelarten, darunter etwa 125 Brutvögel, gezählt. Im Winter sind bis zu 30.000 Zugvögel aus nördlicheren Gebieten am Chiemsee versammelt.



Blaukehlchen (*Luscinia svecica*, engl. Bluethroat), Brutvogel, März bis Oktober



Siedgrünling (*Acrocephalus schoenobaenus*, engl. Sedge Warbler), Brutvogel, April bis Oktober



Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*, engl. Whinchat), Brutvogel, April bis Oktober



Steinbrunnen (*Acrocephalus scirpaceus*, engl. Reed Warbler), Brutvogel, April bis Oktober



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*, engl. Common Stonechat), Brutvogel, erst seit 1985, März bis Oktober



Kornelröschen (*Carpodacus erythrinus*, engl. Common Rosefinch), Brutvogel, erst seit 1987, Mai bis August

Birdlife

With its areas of sedimentation, lowland forests, litter meadows, expanses of reed, and bogs as well as the nearby mountains, the Chiemsee offers a multitude of habitats for a great variety of birds. More than 300 species have been documented since 1950, with 125 breeding in this area. During the winter months, as many as 30,000 waterfowl populate the lake.

Seit 1976 ist der Chiemsee entsprechend der Ramsar-Konvention als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung für Wasser- und Watvögel anerkannt. Zudem besitzt der gesamte Chiemsee den Status eines Vogelschutzgebietes (Special-Protected-Area) nach der Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union. Besonders sensible Uferbereiche wurden als Ruhezonen für Tiere und Pflanzen ausgewiesen.

The Chiemsee is a nationally and internationally recognized bird sanctuary. The Achen delta with its lowland forest and surrounding bogs was declared a bird sanctuary as early as 1954; its area was extended in 1986 to cover 1,250 hectares (3,000 acres). The delta itself is closed to all visitors.

Entenvögel



Höckerstwan (*Cygnus olor*, engl. Mute Swan), Brutvogel, ganzjährig



Stockente (*Anas platyrhynchos*, engl. Mallard), Brutvogel, ganzjährig



Schellente (*Bucephala clangula*, engl. Common Goldeneye), Brutvogel, ganzjährig



Krickente (*Anas crecca*, engl. Green-winged Teal), Brutvogel, ganzjährig



Kolbenente (*Nettion rufina*, engl. Red-crested Pochard), Brutvogel, ganzjährig



Schnatterente (*Anas strepera*, engl. Gadwall), Brutvogel, ganzjährig



Rehente (*Aythya fuligula*, engl. Tufted Duck), Brutvogel, ganzjährig, im Winter sehr häufig



Tafelente (*Aythya ferina*, engl. Common Pochard), ganzjährig, häufig nur im Winter



Löffelente (*Anas clypeata*, engl. Northern Shoveler), Brutvogel, ganzjährig



Gänssäger (*Mergus merganser*, engl. Goosander), seltener Brutvogel, ganzjährig



Graugans (*Amer cygnus*, engl. Greyling Goose), Brutvogel, ganzjährig

Eisvogel




Eisvogel (*Alcedo atthis*, engl. River Kingfisher), Brutvogel, ganzjährig

Rallen



Wasserralle (*Rallus aquaticus*, engl. Water Rail), Brutvogel, ganzjährig, im Winter selten



Bläuhuhn (*Fulca atra*, engl. Black Coot), Brutvogel, ganzjährig, im Winter starker Zuzug



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*, engl. Moorhen), Brutvogel, ganzjährig

Seeschwalbe



Fluss-Seeschwalbe (*Sterna hirundo*, engl. Common Tern), sehr selten gewandener Brutvogel, April bis September

Greifvogel



Seeadler (*Haliaeetus albicilla*, engl. White-tailed Eagle), Wintergast, Oktober bis März

Möwen



Mittelsiemensgans (*Larus michahellis*, engl. Yellow-legged Gull), Brutvogel, ganzjährig



Lachmöwe (*Larus ridibundus*, engl. Black-headed Gull), Brutvogel, ganzjährig

Watvögel



Apenninstrandläufer (*Calidris alpina*, engl. Dunlin), Durchzügler, August bis November



Kahrt (*Vanelus vanellus*, engl. Lapwing), Brutvogel, ganzjährig, im Winter selten



Brachvogel (*Numenius angusta*, engl. Western Cullin), seltener Brutvogel und ganzjähriger Gast

Taucher



Zwergläucher (*Tachybaptus ruficollis*, engl. Little Grebe), Brutvogel, ganzjährig



Schwarzhalbläucher (*Podiceps nigricollis*, engl. Black-necked Grebe), Brutvogel, im Winter selten



Haupttaucher (*Grus grus*, engl. Great Crested Grebe), Brutvogel, ganzjährig

Kormoran



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*, engl. Great Cormorant), Brutvogel, ganzjährig