

Natur. Erlebnis. Chiemsee

Der Chiemsee – ein bedeutender Lebensraum für Vögel



Fitis (*Phylloscopus trochilus*, engl. Willow Warbler), Brutvogel, April bis September

Singvögel

Die vielfältige Vogelwelt zählt zu den besonderen Schätzen des Chiemsees. In dem abwechslungsreichen Lebensraum mit Verlandungsflächen, Streuwiesen, Gebüsch, Wäldern und Mooren und der Wasserfläche selbst wurden seit 1950 über 300 Vogelarten, darunter etwa 125 Brutvögel, gezählt. Im Winter sind bis zu 30.000 Zugvögel aus nördlicheren Gebieten am Chiemsee versammelt.



Blaukehlchen (*Luscinia svecica*, engl. Bluethroat), Brutvogel, März bis Oktober



Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*, engl. Sedge Warbler), Brutvogel, April bis Oktober



Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*, engl. Whinchief), Brutvogel, April bis Oktober



Tüpfelrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*, engl. Reed Warbler), Brutvogel, April bis Oktober



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*, engl. Common Stonechat), Brutvogel erst seit 1985, März bis Oktober



Kornelimpf (*Carduelis erythrinus*, engl. Common Rosefinch), Brutvogel erst seit 1987, Mai bis August

Birdlife

With its areas of sedimentation, lowland forests, litter meadows, expanses of reed, and bogs as well as the nearby mountains, the Chiemsee offers a multitude of habitats for a great variety of birds. More than 300 species have been documented since 1950, with 125 breeding in this area. During the winter months, as many as 30,000 waterfowl populate the lake.

Seit 1976 ist der Chiemsee entsprechend der Ramsar-Konvention als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung für Wasser- und Watvögel anerkannt. Zudem besitzt der gesamte Chiemsee den Status eines Vogelschutzgebietes (Special-Protected-Area) nach der Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union. Besonders sensible Uferbereiche wurden als Ruhezonen für Tiere und Pflanzen ausgewiesen.

The Chiemsee is a nationally and internationally recognized bird sanctuary. The Achen delta with its lowland forest and surrounding bogs was declared a bird sanctuary as early as 1954; its area was extended in 1986 to cover 1,250 hectares (3,000 acres). The delta itself is closed to all visitors.

Entenvögel



Höckerstwan (*Cygnus olor*, engl. Mute Swan), Brutvogel, ganzjährig



Stockente (*Anas platyrhynchos*, engl. Mallard), Brutvogel, ganzjährig



Scheitelente (*Bucephala clangula*, engl. Common Goldeneye), Brutvogel, ganzjährig



Krickente (*Anas creca*, engl. Green-winged Teal), Brutvogel, ganzjährig



Kolbenente (*Nettion rufina*, engl. Red-crested Pochard), Brutvogel, ganzjährig



Schauenteente (*Anas strepera*, engl. Cadwall), Brutvogel, ganzjährig



Reihenente (*Aythya fuligula*, engl. Tufted Duck), Brutvogel, ganzjährig, im Winter sehr häufig



Tafelente (*Aythya ferina*, engl. Common Pochard), ganzjährig, häufig nur im Winter



Löffelente (*Anas cyporea*, engl. Northern Shoveller), Brutvogel, ganzjährig



Gänseräger (*Mergus mergamus*, engl. Goosander), seltener Brutvogel, ganzjährig




Graugans (*Anser anser*, engl. Greylag Goose), Brutvogel, ganzjährig

Rallen



Wasserralle (*Rallus aquaticus*, engl. Water Rail), Brutvogel, ganzjährig, im Winter selten



Bläuhuhn (*Fulica atra*, engl. Black Coot), Brutvogel, ganzjährig, im Winter starker Zuzug



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*, engl. Moorhen), Brutvogel, ganzjährig

Seeschwalbe



Fluss-Seeschwalbe (*Sterna hirundo*, engl. Common Tern), sehr selten geworden Brutvogel, April bis September

Greifvogel



Seeadler (*Haliaeetus albicilla*, engl. White-tailed Eagle), Wintergast, Oktober bis März

Taucher



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*, engl. Little Grebe), Brutvogel, ganzjährig



Schwarzhalbtaucher (*Podiceps nigricollis*, engl. Black-necked Grebe), Brutvogel, im Winter selten



Häubentaucher (*Oriolus oriolus*, engl. Great Crested Grebe), Brutvogel, ganzjährig

Kormoran



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*, engl. Great Cormorant), Brutvogel, ganzjährig

Eisvogel



Eisvogel (*Alcedo atthis*, engl. River Kingfisher), Brutvogel, ganzjährig

Möwen



Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*, engl. Yellow-legged Gull), Brutvogel, ganzjährig



Lachmöwe (*Larus ridibundus*, engl. Black-headed Gull), Brutvogel, ganzjährig

Watvögel



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*, engl. Dunlin), Durchzügler, August bis November



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*, engl. Wood Sandpiper), Durchzügler, Juli bis September



Kiebitz (*Vanellus vanellus*, engl. Lapwing), Brutvogel ganzjährig, im Winter selten



Flussregelpfeifer (*Charadrius dubius*, engl. Little Ringed Plover), Brutvogel, März bis Oktober



Brachvogel (*Numenius arquata*, engl. Western Curlew), seltener Brutvogel und ganzjähriger Gast



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*, engl. Common Sandpiper), Durchzügler, April bis Oktober, sehr seltener Brutvogel